

1 DE DICIEMBRE

En la Argentina, 3 de cada 10 personas con VIH ignoran su estado

Cada año contraen el virus más de 5000. Ello ocurre a pesar de que el test de detección es gratuito en todos los hospitales del país y el tratamiento tiene cobertura total. Preocupan el alto índice de adolescentes mujeres con diagnóstico positivo.



En la Argentina, 3 de cada 10 personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) lo ignoran y se enterarán recién cuando el sistema inmunológico esté lo suficientemente debilitado como para obtener los beneficios del tratamiento temprano y haber puesto en riesgo su vida y la de sus parejas sexuales. Cada año, en el país contraen el virus más de 5000 personas, de acuerdo con los datos oficiales, y mueren unas 1500 personas por enfermedades asociadas con el síndrome de inmunodeficiencia humana o sida. Todo esto ocurre a pesar de que las pruebas de detección del virus son gratuitas en los hospitales del país y el tratamiento antiviral tiene cobertura total. En la ciudad de Corrientes, hoy se podrá hacer el test en la plaza Vera.

"La Argentina se acaba de sumar al grupo de países que proponen 'testear y tratar': facilitar y promover el testeo voluntario y ofrecer tratamiento a todos aquellos cuyo test sea positivo, independientemente de su estado inmunológico", informaron desde la Fundación Huésped. "De las 110.000 personas que, se estima, viven con VIH en la Argentina, un 30% desconocen su situación. Por eso es fundamental redoblar los esfuerzos para facilitar y acercar el testeo", señalan, publica hoy La Nación. En el Boletín Epidemiológico de Sida 2014 se puede leer que el 30,7% de los varones y el 23,2% de las mujeres lo descubren ya en estados avanzados de la infección. De ahí la importancia del diagnóstico temprano.

El test de VIH es gratuito y confidencial, y se realiza en los hospitales y los centros sanitarios de todo el país. Si los profesionales no lo solicitan, los pacientes pueden pedirlo, según aclaró Fundamind.

Actualmente, 60.000 argentinos están recibiendo un tratamiento antirretroviral. El 90% de las infecciones fue por relaciones sexuales sin protección, según detalla el boletín epidemiológico. El 90% de las mujeres y el 47% de los hombres que viven con el VIH contrajeron la infección en relaciones heterosexuales sin protección, mientras que un 43% de la población masculina que vive con el virus lo contrajo en relaciones sexuales con otros hombres sin los cuidados recomendados.

Recientemente, la Asociación Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que está trabajando para generar conciencia de la importancia de la cultura de la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), participó del estudio sobre

Buscar

Búsqueda avanzada
Ediciones anteriores

Lunes 01, diciembre de 2014

Hoy: Inestable

Vientos leves del sector sur.
15° mínima / 20° máxima



estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. Los resultados revelaron que casi el 89,4% de las trabajadoras argentinas se hizo la prueba de VIH alguna vez y que el 97% de las encuestadas utilizan preservativo en el trabajo sexual.

“Las mujeres trabajadoras sexuales no son la principal vía de transmisión del VIH y los estudios demuestran que seguimos bajando la prevalencia en nuestra comunidad”, informó a través de un comunicado la organización que dirige Georgina Orellano, que trabaja con la fundación NEXO, un centro de testeo rápido del VIH y otras ETS.

En tanto, el último informe de la Coordinación de Sida de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un dato preocupante: las adolescentes de 14 a 19 años con un diagnóstico VIH positivo superan a los varones (0,78 hombres por mujer). En la última década, también aumentó la proporción de diagnósticos en las mujeres de 40 años o más y, también, en las jóvenes de 20 a 24 años, según demuestra la revisión epidemiológica que realizó la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

“Cinco mujeres se infectan con VIH por día en el país; la mayoría de ellas contraen el virus a través de relaciones sexuales y muchas aún no lo saben. Nos preocupan especialmente el grupo de las mujeres mayores de 50, que viene creciendo, y las más jóvenes, de entre 15 y 24 años, que son grupos poco considerados en la prevención y en los mensajes a la población”, señaló Mabel Bianco, presidenta de FEIM. > L. R. > Foto: Télam.

Noticias Relacionadas:

- [VIH: instan a realizarse los test voluntarios y gratuitos](#)
- [“Cerremos la brecha”, la nueva meta contra el sida](#)
- [Sida: el nombre del virus, el nombre de la enfermedad](#)

Facebook

Twitter

Enviar a un amigo

Imprimir

Otras redes sociales

0

